

FARMACOS QUE DEBEN RETIRARSE ANTES DE LA Ph-METRIA DE 24 HORAS

DIEZ DIAS ANTES	48 HORAS ANTES
Retirar: Anagastra Audazol Aulcer Belmazol Ceprandal Elgam Emeproton Estomil Gastrimut Indurgan Losec Miol Monolitum Mopral Nexium Norpramin Nuclosina Omapren Omeprazol Ompranyt Opiren Pantecta Pantocarm Pariet Parizac Pepticum Pro-ulco Prysm Sanamidol Ulceral Ulcsep Ulcometion Ulcotenal Zimor	Retirar: Alquen Confobos Coralen Cronol Denulcer Digervin Famotidina Famulcer Gastropen Ingastri Lake Nulcerin Quantor Ran H2 Ranidin Ranitidina Ranix Ranuber Roxiwas Rubacina Rubiulcer Sarilen Tagamet Tairal Tamin Tanidina Terposen Tipodex Toriol Vagostal Zantac Zarocs

FARMACOS QUE PUEDEN TOMARSE COMO ALTERNATIVA A LOS ANTERIORES DURANTE LOS DIAS ANTES DE LA PRUEBA (procurar no tomarlos el día de la prueba): Alcalinos Gelos, Almax, Alubifar, Bemolan, Dolcopin, Geloalumin, Gelodrox, Gelodual, Gelotricar, Gelotrisin, Maalox, Magión, Minoton, Secrepat, Unimaalox.

Para cualquier aclaración llame a Secretaría de la Sección de Pruebas Funcionales Digestivas: tel 934340416